# CIFOUMIC 10 10 10

Azote uréique 10%, Anhydride phosphorique 10%, Oxyde de Potassium 10%, Bore 0.1%, Cuivre 0.05%, Manganèse 0.1%, Zinc 0.05%.

## Présentation du produit

- **Nom Commercial** : CIFOUMIC 10 10 10
- **Classe du produit** : Fertilisant NPK 10-10-10 + Oligo-élémets pour une meilleure production
- **Numéro d'autorisation de vente au Maroc** : 1224/DCPT/SPV/BPH/SI
- **Type de formulation** : Liquide
- **Composition chimique** : Azote uréique 10%, Anhydride phosphorique 10%, Oxyde de Potassium 10%, Bore 0.1%, Cuivre 0.05%, Manganèse 0.1%, Zinc 0.05%.
- **Mode d'action** : CIFOUMIC 10-10-10 est un engrais liquide étudié pour des applications foliaires caractérisées par une grande pureté des composants.
  CIFOUMIC 10-10-10 comporte des macroéléments NPK avec un rapport très équilibré. l'azote est présent sous forme uréique (connu par sa grande absorption par les feuilles.
  CIFOUMIC 10-10-10 comporte des micro-éléments sous forme chélatés pour prévenir les jaunissements et pour stimuler les processus physiologiques qui permettent d'améliorer les productions.
  CIFOUMIC 10-10-10 s'utilise durant toutes les phases du cycle de culture avec un emploi préférentiel lors des phases centrales.
  CIFOUMIC 10-10-10 permet d'obtenir des plantes bien développées de façon équilibrée.

## Efficacité

| Culture | Dose d'emploi |
|---|---|
| Pommier, Poirier, Pêcher, Abricotier, Cerisier | 250-300 g/hl |
| Vigne, Olivier, Agrumes | 250-350 g/hl |
| Pépinières | 200-250 g/hl |
| Plantes potagéres et fraisier | 250-350 g/hl |
| Plantes ornementales | 200-250 g/hl |
| Betterave à Sucre, Tabac, Tournesol | 8-10 kg/ha |
| Pomme de terre, Céréales | 8-10 kg/ha |

## Conditions d'emploi

- **Mode d'emploi** : CET 46 est recommandée pour une pulvérisation foliaire.
- **Période et recommandations d'emploi** :
  Sur Pommier, Poirier, Pêcher, Abricotier, Cerisier : Après la nouaison jusqu'a la véraison.
  Sur Vigne, Olivier, Agrumes : Après la nouaison jusqu'au le murissement.
  Dans les Pépinières : Durant toute la période de végétation.
  Sur les Plantes potagères et fraisier : A partir des premières phases de végétation jusqu'à la récolte.
  Sur Plantes ornementales : Lorsque les plantes sont en pleine végétation.
  Sur Betterave à Sucre, Tabac, Tournesol : Lors des premières phases de la végétation
  Sur Pomme de terre, Céréales : Lors des premières phases de la végétation
  CIFOUMIC 10-10-10 est mélangeable à la dose d'emploi avec tous les produits CIFO, et avec les antiparasitaires en général, à l'exception des huiles blanches, des insecticides à base huileuse, du Phosethyl-Al, doguadines, triforines, des produits à base de branches. Administrer seulement après 10 jours de l'application des produits pour branches.
  En milieu protégé (serres, tunnels, etc), la dose foliaire ne doit pas dépasser 50-80 g par hl d'eau. Les traitements foliaires sont faits de préférence aux heures les plus fraîches de la journée.

- **Conditionnement : 1 Kg.**